

Ergänzung zum Evaluationsbericht 2012 - Niederösterreich
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter

Ergebnisse zum Messzeitpunkt 3



Eine Maßnahme im Rahmen der österreichweiten Vorsorgestrategie.
Finanziert aus Mitteln der Bundesgesundheitsagentur.



G'scheit g'sund.
Eine Initiative des
Bundesministeriums für Gesundheit.

Impressum

Im Auftrag von:

AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Zentrum Ernährung & Prävention, Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien, www.ages.at

Bundesministerium für Gesundheit, Radetzkystraße 2, 1030 Wien, www.bmg.gv.at

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Kundmanngasse 21, 1031 Wien, www.sozialversicherung.at

Für den Inhalt verantwortlich:

Mag.^a Melanie U. Bruckmüller

Mag.^a Bettina Meidlinger

Dr.ⁱⁿ Birgit Dieminger (Programmleitung)

Unter Mitarbeit von (in alphabetischer Reihenfolge):

Lisa Buchinger, Bakk.

Mag.^a Bernadette Bürger

Nadine Fröschl, MSc

Mag.^a Katrin Seper

Mag.^a Nadja Wüst

Foto: fotolia

Kontakt: team@richtigessenvonanfangen.at

Internet: <http://www.richtigessenvonanfangen.at>

© AGES, BMG & HVB, März 2014

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Programms „Richtig essen von Anfang an!“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
2	Ziele	7
3	Methodik	7
3.1.	Fragebogen	7
3.2.	Dateneingabe	8
3.3.	Datenbereinigung	8
3.4.	Statistische Auswertung	8
3.5.	Stichprobe	10
4	Ergebnisse der Evaluierung	10
4.1.	Stillen	10
4.1.1.	Stillhäufigkeit und Stilldauer	10
4.1.2.	Verwendung von Säuglingsmilchnahrungen	11
4.2.	Ziele	12
4.2.1.	Einhaltung der Empfehlungen	12
4.2.1.1.	Alter des Kindes bei der Beikosteinführung	13
4.2.1.2.	Welches Lebensmittel haben Sie Ihrem Kind als erste Beikost gegeben?	13
4.2.1.3.	Alter bei Einführung von bestimmten Lebensmitteln	14
4.2.1.4.	Alter bei Einführung von bestimmten Getränken	15
4.2.2.	Die Überprüfung des Wissenszuwachses	17
4.2.2.1.	Wissenszuwachs	17
4.2.3.	Anwendbarkeit der vermittelten Inhalte im Lebensalltag	19
4.2.3.1.	Umsetzbarkeit der Ernährungstipps/Informationen allgemein	19
4.2.3.2.	Umsetzung der Inhalte des Workshops im Alltag	19
4.2.4.	Steigerung der Selbstwirksamkeit der (werdenden) Eltern und Bezugspersonen	22
4.2.4.1.	Beitrag des Workshops für die Gesundheit des Kindes	22
4.2.4.2.	Umsetzung der Empfehlungen trotz Hindernissen	23
4.3.	Weiterempfehlung und erneute Teilnahme	24
4.3.1.	Weiterempfehlung des Workshops „Babys erstes Löffelchen – Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter“	24
4.3.2.	Teilnahme an einem Workshop zum Thema „Ernährung von Ein- bis Dreijährigen“	24
5	Anhang	25

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	„Wurde das Kind gestillt?“ _____	10
Abbildung 2	Häufigkeit der Verwendung von Säuglingsmilchnahrungen _____	11
Abbildung 3	Welche der folgenden Säuglingsmilchnahrungen haben Sie verwendet? _____	12
Abbildung 4	Wissensstand der Teilnehmerinnen zu den Messzeitpunkten 1, 2 und 3 _____	18
Abbildung 5	Umsetzbarkeit der im Workshop vermittelten Ernährungstipps/Informationen _____	19
Abbildung 6	Umsetzbarkeit der Workshopinhalte im Alltag _____	20
Abbildung 7	„Selbstwirksamkeit“ – Vergleich MZP 1 mit MZP 2 und mit MZP 3 _____	22
Abbildung 8	Umsetzbarkeit der Empfehlungen – Vergleich MZP 1 mit MZP 2 und MZP 3 _____	23

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1</i>	<i>„Wie lange wurde das Baby (ausschließlich) gestillt?“</i>	<i>11</i>
<i>Tabelle 2</i>	<i>Alter bei Beikosteinführung in Lebenswochen</i>	<i>13</i>
<i>Tabelle 3</i>	<i>Einführung von bestimmten Lebensmitteln und Alter bei Einführung in Lebenswochen</i>	<i>14</i>
<i>Tabelle 4</i>	<i>Einführung von bestimmten Getränken und Alter bei Einführung in Lebenswochen</i>	<i>15</i>
<i>Tabelle 5</i>	<i>Wissensscores der Teilnehmerinnen zu den Messzeitpunkten 1, 2 und 3 (im querschnittlichen Vergleich)</i>	<i>17</i>

Abkürzungsverzeichnis

g	Gramm
HA-Nahrung	hypoallergene Nahrung
LJ	Lebensjahr
Max	Maximum
MD	Median
Min	Minimum
MW	Mittelwert
MZP	Messzeitpunkt
n	Strichprobenumfang
ns	nicht signifikant
Pre-Nahrung	Säuglingsanfangsnahrung
REVAN	Richtig essen von Anfang an!
sd	Standardabweichung

1 Einleitung

Bei dem vorliegenden Bericht handelt es sich um eine Ergänzung zum Evaluationsbericht 2012.

Zu den einmalig stattfindenden Ernährungsworkshops wird eine begleitende Ergebnisevaluation durchgeführt. Dafür finden insgesamt 3 Erhebungen statt. Zu Beginn (Messzeitpunkt 1 – MZP 1), unmittelbar danach (Messzeitpunkt 2 – MZP 2) und ein Jahr nach dem Workshopbesuch (Messzeitpunkt 3 – MZP 3) füllen die TeilnehmerInnen jeweils einen Fragebogen aus. Das Hauptziel der Evaluation besteht darin, den Nutzen der Ernährungsworkshops für die TeilnehmerInnen und die Nachhaltigkeit abzuschätzen und durch die laufende Beobachtung und Reflexion, die Qualität der Maßnahme zu verbessern.

Im Evaluationsbericht 2012 wurden die Ergebnisse der Messzeitpunkte 1 und 2 beschrieben. Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse des 3. Messzeitpunktes, ein Jahr nach dem Workshop.

2 Ziele

Zur Überprüfung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Workshops wurden im Vorfeld folgende Ziele festgelegt:

- die Feststellung des Ausmaßes in dem das Verhalten mit den Empfehlungen übereinstimmt (Einhaltung der Empfehlungen).
- die Überprüfung des Wissenszuwachses von ernährungsspezifischen Empfehlungen zum Thema „Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter“ durch die Workshops.
- die Feststellung des Ausmaßes der Anwendbarkeit der vermittelten Inhalte im Lebensalltag der TeilnehmerInnen (Praktikabilität der Tipps).
- die Überprüfung der Steigerung der Selbstwirksamkeit der Eltern und Bezugspersonen. Dies umfasst die Selbstsicherheit, mit Problemen besser umgehen zu können und – falls Schwierigkeiten auftreten – diese zu meistern.

Durch die Abhaltung des Workshops galt es, diese Ziele zu erreichen.

3 Methodik

3.1. Fragebogen

Alle Teilnehmerinnen, die sich bereit erklärt haben, für eine weitere Umfrage zur Verfügung zu stehen (Angabe der Adresse oder E-Mail-Adresse), bekamen ca. ein Jahr nach der Teilnahme am Workshop entweder eine elektronische Einladung mit Hyperlink zu einem Onlinefragebogen oder einen Fragebogen per Post zugeschickt.

Der Fragebogen beinhaltet Fragen zur Alltagstauglichkeit und praktischen Umsetzbarkeit der im Workshop vermittelten Informationen. Im Weiteren wurden Fragen zum Stillen und zur Einführung von Beikost gestellt. Zusätzlich wird erneut der Wissensfragebogen, der auch Teil der ersten beiden Erhebungen ist, beigelegt, um die Nachhaltigkeit des erworbenen Wissens zu überprüfen.

3.2. Dateneingabe

Die Dateneingabe der Onlinebefragung erfolgte mittels des Online-Systems askallo® durch die Befragungsteilnehmerinnen selbst, die elektronische Erfassung der Papierfragebögen wurde durch das Team REVAN national mit der Software Microsoft Excel durchgeführt.

Im Jahr 2013 wurde im elektronischen Fragebogen nur nach dem Hauptwohnsitz und nicht nach dem Bundesland, in welchem der/die Befragte den Ernährungsworkshop besucht hatte, gefragt. Für die Auswertung wurde angenommen, dass der Hauptwohnsitz in dem Bundesland liegt, in dem der Workshop ein Jahr zuvor besucht wurde.

3.3. Datenbereinigung

Die Daten wurden durch REVAN national auf Plausibilität überprüft. Dabei wurden ungültige und unplausible Angaben durch das Ausweisen als „keine Angabe“ bereinigt.

3.4. Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung wurde mit der Software SPSS Version 20 durchgeführt.

Bei metrischen Variablen wie z. B. der Stlldauer oder dem Alter der Beikosteinführung (bzw. dem Alter der Einführung bestimmter Nahrungsmittel und Getränke) wurden die statistischen Kennzahlen Mittelwert (MW), Standardabweichung (sd), Minimum (Min) und Maximum (Max) berechnet. Bei den übrigen geschlossenen Fragestellungen wurden relative Häufigkeiten berechnet. Bei ordinalen und nominalen Daten wurden jene Personen, die keine Angabe machten, in die Auswertung miteinbezogen und bei den jeweiligen Antworten als „keine Angabe“ ausgewiesen. Bei metrischen Daten beziehen sich die Kennzahlen ausschließlich auf vorhandene bzw. gültige Einträge. Zur besseren Lesbarkeit wurden im vorliegenden Bericht gerundete Werte verwendet. Aufgrund dieser Rundung ergeben die Summen der relativen Zahlen nicht immer exakt 100 %. Das betrifft sowohl die im Text verwendeten Zahlen als auch Zahlen in Diagrammen und Tabellen.

Fragen zum Wissen

In Bezug auf die Wissensfragen wurde die Berechnung von Gesamtscores (für alle 3 Messzeitpunkte) vorgenommen. Der Wissensfragebogen bestand aus insgesamt 11 Multiple-Choice-Fragen (zur Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter), bei denen unterschiedlich viele Antworten korrekt sein konnten; eine Antwort war jedoch mindestens richtig. Bei Fragen mit nur einer richtigen Antwortmöglichkeit, gab es für jede korrekt beantwortete Frage einen Punkt. Bei Fragen, bei denen Mehrfachantworten möglich waren, konnte für jede Antwortmöglichkeit ein Punkt erreicht werden. Wurde die gesamte Frage falsch beantwortet bzw. „bin nicht sicher“ angegeben, wurde für die jeweilige Frage kein Punkt vergeben. Insgesamt konnten 28 Punkte erreicht werden.

Die Gesamtscores wurden als Mittelwert (MW), Standardabweichung (sd), Median (MD), Minimum (Min) und Maximum (Max) berechnet. Der Wissensscore der TeilnehmerInnen wurde zusätzlich in 3 Gruppen (geringer Wissensstand, mittlerer Wissensstand und hoher Wissensstand) kategorisiert. Personen, die mindestens drei Viertel der maximalen Punkteanzahl erreichten, wurden in die Kategorie „hoher Wissensstand“ und jene Personen, die die Hälfte oder weniger der maximalen Punkteanzahl erreichten, in die Kategorie „geringer Wissensstand“ eingeteilt. Als „mittel“ wurde der Wissensstand bewertet, wenn die TeilnehmerInnen mehr als die Hälfte aber weniger als drei Viertel der zu erreichenden Punkte bekamen.

Zur Überprüfung des Wissens über ernährungsspezifische Empfehlungen wurde den TeilnehmerInnen zu allen 3 Messzeitpunkten der gleiche Wissensfragebogen vorgelegt.

Für die statistische Auswertung zum Wissenszuwachs wurden alle Personen inkludiert, die die entsprechenden Fragen zu mindestens einem der 3 Messzeitpunkte ausfüllten (querschnittlicher Vergleich). Die Daten wurden zunächst auf Normalverteilung getestet. Da keine Normalverteilung gegeben war, wurden in weiterer Folge entsprechende nichtparametrische Tests verwendet. Als statistisch signifikant wurden Unterschiede, bei denen statistische Testverfahren eine Irrtumswahrscheinlichkeit von $p < 0,05$ ergaben, bewertet.

Fragen zur Selbstwirksamkeit und Umsetzung

Bei allen 3 Messzeitpunkten wurden Fragen zur Selbstwirksamkeitserwartung und Umsetzung gestellt. Um alle 3 Messzeitpunkte in Bezug auf diese Fragen miteinander vergleichen zu können, wurden die Antwortkategorien der MZP 1 und 2 an die des MZP 3 angepasst.

Die Auswertung der Fragen zur Selbstwirksamkeitserwartung und Umsetzung erfolgte im querschnittlichen Vergleich, d. h., es wurden alle Personen, die die Fragen zum jeweiligen Messzeitpunkt ausfüllten, in die Analyse eingeschlossen. Es wurden entsprechende nichtparametrische Tests verwendet. Als statistisch signifikant wurden Unterschiede, bei denen statistische Testverfahren eine Irrtumswahrscheinlichkeit von $p < 0,05$ ergaben, bewertet.

3.5. Stichprobe

Jede Person, die im Jahr 2012 an einem Ernährungsworkshop teilnahm, wurde ein Jahr nach dem Workshop eingeladen, an einer weiteren Umfrage teilzunehmen. Insgesamt wurden in Niederösterreich **12 Personen** angeschrieben. Davon füllten **10 Personen** den Fragebogen zum Messzeitpunkt 3 (MZP 3) aus. Das entspricht einer Rücklaufquote von 83,3 %.

Bei insgesamt **einer Person** (4,8 %) konnten die Daten des MZP 3 zu den Daten des MZP 1 und 2 zugeordnet werden. Gelegentlich wurden Fragen von Seiten der ausfüllenden Personen bewusst oder auch unbeabsichtigt nicht beantwortet. Die Anzahl dieser Fälle wird in den Tabellen im Ergebnisteil durch die Kategorie „keine Angabe“ dargestellt.

Nicht eindeutige oder zweifelhafte Antworten wurden als „keine Angabe“ gewertet.

Bei den Fragen zur Kinderernährung (Stillen, Säuglingsmilchnahrung und Beikost) ergab sich eine geringere Stichprobengröße, da nur Personen mit Kind in die Auswertung inkludiert wurden.


4 Ergebnisse der Evaluierung

4.1. Stillen

4.1.1. Stillhäufigkeit und Stildauer

Auf die Frage „Wurde das Kind gestillt?“ antworteten 80,0 % der Teilnehmerinnen (n=8) mit „Ja“ und 20,0 % (n=2) mit „nein“ (Abbildung 1).

Abbildung 1 „Wurde das Kind gestillt?“ ($n_{\text{gesamt}}=10$)



Von jenen befragten Teilnehmerinnen, deren Baby gestillt wurde (n=8), machten jeweils 87,5 % (n=7) eine Angabe über die ausschließliche und über die insgesamt Stildauer.

Nach Angaben der Teilnehmerinnen wurden die Babys im Mittel bis zur 18. Lebenswoche ($18,4 \pm 8,8$) ausschließlich und bis zur 38. Lebenswoche ($37,7 \pm 16,0$) insgesamt gestillt. Die Angaben zur ausschließlichen Stildauer reichten von der 1. bis 25. Lebenswoche und die Angaben zur insgesamten Stildauer von der 15. bis zur 59. Lebenswoche (Tabelle 1).

Mit Beikost sollte in etwa um den 6. Lebensmonat, nicht jedoch vor Beginn des 5. Monats (17. Lebenswoche) und nicht nach Ende des 6. Monats (26. Lebenswoche) begonnen werden. Bei 71,4 % der Befragten (n=5), die eine ausschließliche Stilldauer angaben, wurde das Baby mindestens bis zum 5. Lebensmonat und maximal bis zum Ende des 6. Lebensmonats ausschließlich gestillt.

Tabelle 1 „Wie lange wurde das Baby (ausschließlich) gestillt?“

	Angabe „bis zur ... Lebenswoche“	Baby wird noch (ausschließlich) gestillt	keine Angabe	Stilldauer (bis zur ... Lebenswoche) ¹		
	Angaben in % (n _{gesamt} =8)			n (fehlend) ²	MW ± sd	Min - Max
ausschließliche Stilldauer ³	87,5	-	12,5	7 (0)	18,4 ± 8,8	1 – 25
insgesamte Stilldauer ⁴	87,5	12,5	-	7 (0)	37,7 ± 16,0	15 – 59

¹ Die Angabe zur (ausschließlichen) Stilldauer bezieht sich auf jene Teilnehmerinnen, welche eine Angabe „bis zur ... Lebenswoche“ machten.

² Die fehlenden Werte ergeben sich dadurch, dass zwar das Feld „bis zur ... Lebenswoche“ angekreuzt, aber keine Lebenswoche genannt wurde.

³ nur Muttermilch, keine zusätzliche Gabe von Flüssigkeit oder Nahrung; gegebenenfalls jedoch zusätzlich Medikamente, Vitamine, Mineralstoffe


⁴ ausschließliches Stillen, Voll- und Teilstillen

Zum Zeitpunkt der Befragung gaben keine Teilnehmerinnen an, dass das Baby noch ausschließlich gestillt wird. Noch insgesamt zu stillen wurde von 12,5 % der Teilnehmerinnen (n=1) genannt (Tabelle 1).

4.1.2. Verwendung von Säuglingsmilchnahrungen

Insgesamt gaben 80,0 % der Teilnehmerinnen (n=8) an, Säuglingsmilchnahrungen verwendet zu haben. Keine Säuglingsmilchnahrung verwendet zu haben, gaben 20,0 % der Teilnehmerinnen (n=2) an (Abbildung 2).


Abbildung 2 Häufigkeit der Verwendung von Säuglingsmilchnahrungen (n_{gesamt}=10)



Wenn Säuglingsmilchnahrungen verwendet werden, sind Säuglingsanfangsnahrungen mit der Bezeichnung „Pre“ für das gesamte erste Lebensjahr am besten geeignet.

Bezogen auf jene Teilnehmerinnen, die Säuglingsmilchnahrungen verwendet haben (n=8), gaben alle 8 Teilnehmerinnen an, dem Baby Pre-Nahrung und/oder HA-Pre-Nahrung gegeben zu haben. Jeweils 50,0 % der Teilnehmerinnen (n=4) antworteten zudem, „1er“-Nahrung und/oder HA „1er“-Nahrung sowie Folgenahrung („2er“- und „3er“-Nahrung) und/oder HA-Folgenahrung („2er“- und „3er“-Nahrung) verwendet zu haben. Die Teilnehmerinnen konnten bei dieser Frage Mehrfachantworten geben (Abbildung 3).

Abbildung 3 Welche der folgenden Säuglingsmilchnahrungen haben Sie verwendet? (n=8)



* Folgenahrung („2er“- und „3er“-Nahrung) und/oder HA-Folgenahrung („2er“- und „3er“-Nahrung)

4.2. Ziele

4.2.1. Einhaltung der Empfehlungen

Die Einhaltung der Ernährungsempfehlungen wurde anhand der Angaben zum Alter der Einführung von bestimmten Lebensmitteln überprüft.

Empfehlungen:

- Je nach individueller Entwicklung des Kindes sollte etwa um den 6. Lebensmonat Beikost eingeführt werden, jedoch nicht vor Beginn des 5. Monats (17. Lebenswoche) und nicht nach Ende des 6. Monats (26. Lebenswoche). Zu Beikostbeginn sind eisenreiche Lebensmittel wie beispielsweise Fleisch besonders wichtig.
- Kuhmilch kann ab dem 6. Lebensmonat (23. Lebenswoche) für die Zubereitung eines Milch-Getreide-Breis verwendet werden. Kuhmilch als Getränk ist im ersten Lebensjahr ungeeignet.
- Kleine Mengen von glutenhaltigem Getreide können mit Beginn der Beikost gegeben werden. Die Einführung von kleinen Mengen Gluten zwischen Beginn des 5. Monats und Beginn des 7. Monats während des Weiterstillens, kann der Entstehung von Zöliakie, Diabetes mellitus Typ 1 und Weizenallergie vorbeugen.

- Ei und Fisch kann mit Beginn der Beikost in die Ernährung des Säuglings eingeführt werden. Der Konsum von Fisch des Kindes im 1. Lebensjahr kann einen protektiven Effekt auf die Entwicklung allergischer Erkrankungen haben.
- Zucker, zuckerhaltige Lebensmittel (Süßigkeiten, etc.) und Getränke sollten im Hinblick auf die Kariesprophylaxe im ersten Lebensjahr und um den Schwellenwert für süß auf einem niedrigen Level zu halten, vermieden werden.
- Salz und salzhaltige Lebensmittel (Knabbergebäck, etc.) sollten im Hinblick auf die Prävention von Bluthochdruck und um den Schwellenwert für salzig auf einem niedrigen Level zu halten, vermieden werden.
- Mit Beginn der Beikosteinführung kann zusätzlich Flüssigkeit angeboten werden. Während des ausschließlichen Stillens sind für gesunde Säuglinge keine Getränke nötig.

4.2.1.1. *Alter des Kindes bei der Beikosteinführung*

Bei der Frage nach dem Alter des Kindes bei der Einführung der ersten festen Nahrung (= Beikost) in Form von Brei gaben alle der 10 befragten Personen eine Lebenswoche an. Im Mittel lag das Alter bei Beikosteinführung in der 22. Lebenswoche ($21,6 \pm 2,1$). Das jüngste Kind war beim Beikoststart in der 18. Lebenswoche und das älteste Kind erhielt in der 25. Lebenswoche zum ersten Mal Beikost. Somit erhielten alle Kinder in Niederösterreich die erste feste Nahrung innerhalb des empfohlenen Zeitfensters zur Beikosteinführung (Tabelle 2).

Tabelle 2 *Alter bei Beikosteinführung in Lebenswochen ($n_{gesamt}=10$)*

	n (fehlend)	MW \pm sd	Min - Max
Alter in Lebenswochen (in der Lebenswoche)	10 (0)	21,6 \pm 2,1	18 – 25

4.2.1.2. *Welches Lebensmittel haben Sie Ihrem Kind als erste Beikost gegeben?*

Von den zum MZP 3 befragten Teilnehmerinnen beantworteten alle ($n=10$) die Frage „Welches Lebensmittel haben Sie Ihrem Kind als erste Beikost gegeben?“.

Alle Befragten ($n=10$) gaben an, alleinig mit Gemüse als erste Beikost begonnen zu haben. Am häufigsten wurde mit 60,0 % angegeben, ausschließlich Karotte ($n=6$) gegeben zu haben, gefolgt von Kürbis mit 30,0 % ($n=3$). Die überwiegende Mehrheit (90,0 %, $n=9$) gab nur eine Gemüsesorte als erste Beikost an. Lediglich eine Person (10,0 %) entschied sich für eine Kombination aus zwei Gemüsesorten (Karotte, Pastinake).

4.2.1.3. Alter bei Einführung von bestimmten Lebensmitteln

Tabelle 3 gibt einen Überblick darüber, ob ein bestimmtes Lebensmittel zum Zeitpunkt der Befragung bereits in die Ernährung des Säuglings eingeführt wurde und wenn ja, in welcher Lebenswoche dieses zum ersten Mal gegeben wurde.

Ein Jahr nach dem Workshopbesuch hatten alle 10 befragten Personen mindestens ein Lebensmittel in den Speiseplan des Säuglings eingeführt. Fleisch/Geflügel, Hühnerei sowie glutenhaltiges Getreide wurden am häufigsten (je 80 %, je n=8) bereits eingeführt.

Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf jene Kinder, für die eine Lebenswoche angegeben wurde. Die Empfehlung zum Alter bei der Beikosteinführung wurde zu 100 % eingehalten. Kein Kind erhielt vor dem Beginn des 5. Lebensmonats Beikost. 12,5 % der Kinder bekamen entsprechend der Empfehlung innerhalb ihrer ersten 4 Beikostwochen Fleisch/Geflügel zum ersten Mal zu essen. Die Empfehlungen zum Kuhmilchkonsum wurden genau eingehalten. Die Kinder bekamen weder Kuhmilch in Form eines Breis vor der 23. Lebenswoche noch als Getränk vor dem 1. Geburtstag. Hinsichtlich Einführung von Salz und Süßigkeiten gab es Abweichungen von der Empfehlung. Obwohl diese Lebensmittel im ersten Lebensjahr gemieden werden sollten, bekamen 66,7 % der Kinder Salz in Form von zubereiteter Beikost und 50,0 % Süßigkeiten.

Tabelle 3 Einführung von bestimmten Lebensmitteln und Alter bei Einführung in Lebenswochen

	bereits eingeführt	noch nicht eingeführt	keine Angabe	Alter bei Einführung in Lebenswochen (in der Lebenswoche) ¹		
	Angaben in % (n _{gesamt} =10)			n (fehlend) ²	MW ± sd	Min - Max
Fleisch/Geflügel	80,0	0	20,0	8 (0)	28,1 ± 5,1	24 – 40
Kuhmilch in Form eines Breis	50,0	40,0	10,0	5 (0)	50,8 ± 16,8	30 – 76
Kuhmilch als Getränk	30,0	60,0	10,0	3 (0)	55,7 ± 3,8	53 – 60
Glutenhaltiges Getreide	80,0	0	20,0	7 (1)	27,4 ± 4,0	20 – 32
Hühnerei	80,0	20,0	0	8 (0)	43,1 ± 12,1	30 – 57
Fisch	70,0	10,0	20,0	7 (0)	36,6 ± 7,0	29 – 50
Süßigkeiten	60,0	30,0	10,0	6 (0)	43,7 ± 12,6	30 – 57
Salz (f. Zubereitung Beikost)	30,0	50,0	20,0	3 (0)	50,3 ± 6,5	44 – 57

¹ Die Angabe zum Alter bei Einführung von bestimmten Lebensmitteln bezieht sich auf jene Teilnehmerinnen, welche eine Angabe „bis zur Lebenswoche“ machten.

² Die fehlenden Werte können sich dadurch ergeben, dass zwar das Feld „bis zur Lebenswoche“ angekreuzt, aber keine Lebenswoche genannt wurde.

4.2.1.4. Alter bei Einführung von bestimmten Getränken

Tabelle 4 gibt einen Überblick darüber, ob ein bestimmtes Getränk zum Zeitpunkt der Befragung bereits in die Ernährung des Säuglings eingeführt wurde und wenn ja, in welcher Lebenswoche dieses zum ersten Mal gegeben wurde.

Ein Jahr nach dem Workshopbesuch wurde am häufigsten (80,0 %, n=8) Wasser/Mineralwasser bereits eingeführt. Weitere zwei Fünftel der Befragten gaben dem Kind schon Tee ohne Zucker (40,0 %, n=4) und 30,0 % Fruchtsaft (n=3). Der Großteil der Kinder erhielt noch keinen Verdünnungssaft/Sirup oder Limonade (je 90,0 %, je n=9). Kein Kind bekam bereits Tee mit Zucker zu trinken. Insgesamt hatten 8 der 10 befragten Personen bereits mindestens ein Getränk in den Speiseplan des Säuglings eingeführt.

In Niederösterreich wurde durchschnittlich am frühesten Wasser/Mineralwasser (24. Lebenswoche) sowie Tee ohne Zucker als Getränk gegeben (25. Lebenswoche), gefolgt von Fruchtsaft (33. Lebenswoche). Lediglich einem Kind wurde bereits vor dem empfohlenen frühesten Beikostbeginn ein Getränk angeboten, wobei dieses Tee ohne Zucker erhielt. Im Hinblick auf die Kariesprophylaxe sollten zuckerhaltige Getränke im ersten Lebensjahr vermieden werden. Keine der befragten Personen bot dem Kind im ersten Lebensjahr die zuckerhaltigen Getränke Tee mit Zucker oder Limonade an. 3 Kindern wurde schon innerhalb des ersten Lebensjahres Fruchtsaft angeboten und einem Kind Verdünnungssaft/Sirup.

Gemäß österreichischen Beikostempfehlungen ist Wasser das ideale Getränk für Säuglinge. Von jenen Personen, die bereits mindestens ein Getränk eingeführt hatten (80,0 %, n=8), folgte ein Viertel (25,0 %, n=2) der Empfehlung und gab dem Säugling ausschließlich Wasser/Mineralwasser zu trinken. Wobei diese Personen das Wasser auch erst ab dem empfohlenen frühesten Beikostbeginn anboten.

Tabelle 4 Einführung von bestimmten Getränken und Alter bei Einführung in Lebenswochen

	bereits eingeführt	noch nicht eingeführt	keine Angabe	Alter bei Einführung in Lebenswochen (in der Lebenswoche) ¹		
	Angaben in % (n _{gesamt} =10)			n (fehlend) ²	MW ± sd	Min - Max
Tee mit Zucker	-	100	-	-	-	-
Tee ohne Zucker	40,0	40,0	20,0	4 (0)	24,5 ± 7,1	15 – 30
Wasser/ Mineralwasser	80,0	-	20,0	8 (0)	24,3 ± 4,3	18 – 32
Fruchtsaft	30,0	60,0	10,0	3 (0)	33,3 ± 10,4	25 – 45
Verdünnungssaft/ Sirup	10,0	90,0	-	1 (0)	50	-

	bereits eingeführt	noch nicht eingeführt	keine Angabe	Alter bei Einführung in Lebenswochen (in der Lebenswoche) ¹		
	Angaben in % (n _{gesamt} =10)			n (fehlend) ²	MW ± sd	Min - Max
Limonade	10,0	90,0	-	1 (0)	67	-

¹Die Angabe zum Alter bei Einführung von Getränken bezieht sich auf jene Teilnehmerinnen, welche eine Angabe „bis zur Lebenswoche“ machten.

²Die fehlenden Werte können sich dadurch ergeben, dass zwar das Feld „bis zur Lebenswoche“ angekreuzt, aber keine Lebenswoche genannt wurde.

Fazit

In Niederösterreich lag das durchschnittliche Alter bei Beikost Einführung in der 22. Lebenswoche und alle Befragten hielten sich an das empfohlene Zeitfenster zur Beikost Einführung. Von allen Teilnehmerinnen wurde Gemüse als erste feste Nahrung gegeben, wobei generell am häufigsten ausschließlich Karotte für den Beikostbeginn gewählt wurde.

Allgemein zeigte sich eine sehr hohe Bereitschaft, die Beikostempfehlungen einzuhalten. Die einzigen Abweichungen ergaben sich bei der Einführung von Süßigkeiten und Salz, die teilweise zu früh gegeben beziehungsweise zu früh als Gewürz für die Beikostzubereitung verwendet wurden.

Weitaus am häufigsten wurde von den Teilnehmerinnen in Niederösterreich Wasser/Mineralwasser bereits als Getränk beim Säugling eingeführt. Dieses wurde von allen erfragten Getränken auch durchschnittlich am frühesten angeboten, gefolgt von Tee ohne Zucker, wobei lediglich einem Kind Tee ohne Zucker bereits vor dem empfohlenen frühesten Beikostbeginn gegeben wurde, keinem Kind wurde Wasser/Mineralwasser gegeben. Ein Viertel der Kinder, welche bereits mindestens ein Getränk erhielten, bekam ausschließlich Wasser/Mineralwasser zu trinken. Die Empfehlung zuckerhaltige Getränke im ersten Lebensjahr zu vermeiden, wurde größtenteils eingehalten (bezüglich Tee mit Zucker und Limonade). Eine Teilnehmerin hielt sich jedoch bei Verdünnungssaft/Sirup nicht an die Empfehlung und bot diesen schon vor dem ersten Geburtstag an.

4.2.2. Die Überprüfung des Wissenszuwachses

4.2.2.1. Wissenszuwachs

Wie bereits zu den Messzeitpunkten 1 und 2 (vor und unmittelbar nach dem Workshop), wurde auch zum Messzeitpunkt 3 (ein Jahr nach dem Workshop) der Wissensstand der Teilnehmerinnen zu den Themen Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter überprüft. Die Teilnehmerinnen erhielten zu allen 3 Messzeitpunkten den gleichen Wissensfragebogen. Details zum Wissenstest sind im Kapitel 3.4 sowie im Evaluationsbericht des Vorjahres beschrieben.

Um den Verlauf des Wissensstandes vor, unmittelbar nach und ein Jahr nach dem Workshop zu überprüfen, wurden die neu erhobenen Daten des Messzeitpunktes 3 mit den im Vorjahr publizierten Daten des Messzeitpunktes 1 und 2 ausgewertet.

Im Evaluationsbericht 2012 wurden die Messzeitpunkte im longitudinalen Vergleich ausgewertet. Aufgrund der geringen Anzahl an Personen, bei denen die Daten des MZP 3 zu den Daten des MZP 1 und 2 zuordenbar waren ($n=1$), wurde in diesem Bericht ein querschnittlicher Vergleich für die Auswertung aller 3 Messzeitpunkte durchgeführt. Dafür wurden alle Personen, die den Wissensfragebogen zu mindestens einem der Messzeitpunkte ausfüllten, inkludiert. Für den MZP 1 ergibt sich eine Stichprobe von 15 Personen, 14 Personen für den MZP 2 und 5 Personen für den MZP 3. Im Vergleich zum Evaluationsbericht 2012 können die Ergebnisse zum MZP 1 und 2 – aufgrund der unterschiedlichen Stichprobengröße – geringfügig abweichen.

Vor Beginn des Workshops (MZP 1) erreichten die Befragten einen Gesamtscore im Mittel von $20,7 \pm 5,8$ Punkten. Unmittelbar nach dem Workshop konnte ein signifikant höherer durchschnittlicher Wissensscore ($p < 0,001$) beobachtet werden. Der Gesamtscore lag zum MZP 2 bei durchschnittlich $26,2 \pm 2,8$ Punkten. Das entspricht einem Anstieg im Vergleich zum MZP 1 in der Höhe von 26,6 % (5,5 Punkte).

Die Punktzahl unterschied sich ein Jahr nach dem Workshop (MZP 3) nicht signifikant zum MZP 2 ($p > 0,05$). Die Teilnehmerinnen erzielten einen Gesamtscore im Mittel von $24,6 \pm 1,1$ Punkten. Im Vergleich zum MZP 2 war der gemittelte Score um 6,1 % geringer.

Verglichen mit dem Wissensstand vor dem Workshop (MZP 1) ist das Wissen ein Jahr nach dem Workshop (MZP 3) nicht signifikant unterschiedlich ($p > 0,05$). Der gemittelte Score lag zum MZP 3 aber dennoch um 18,8 % (3,9 Punkte) höher als zum MZP 1 (Tabelle 5).


Tabelle 5 Wissensscores der Teilnehmerinnen zu den Messzeitpunkten 1, 2 und 3 (im querschnittlichen Vergleich) ($n_{MZP 1}=15$, $n_{MZP 2}=14$, $n_{MZP 3}=5$)

	n	MW \pm sd	MD	Min - Max	p
MZP 1	15	$20,7 \pm 5,8$	23	8 – 27	MZP 1 & 2: $p < 0,001$ MZP 2 & 3: $p > 0,05$ (ns) MZP 1 & 3: $p > 0,05$ (ns)
MZP 2	14	$26,2 \pm 2,8$	27	18 – 28	
MZP 3	5	$24,6 \pm 1,1$	25	23 – 26	

Zusätzlich zu den Wissensscores wurde das Wissen der Teilnehmerinnen anhand der 3 Gruppen „geringer Wissensstand“ (<15 Punkte), „mittlerer Wissensstand“ (15 – 21 Punkte) und „hoher Wissensstand“ (>21 Punkte) beurteilt (siehe Kapitel 3).

Vor Beginn des Workshops (MZP 1) hatten 20,0 % der Teilnehmerinnen (n=3) einen geringen Wissensstand, 13,3 % (n=2) einen mittleren Wissensstand und 66,7 % (n=10) einen hohen Wissensstand. Unmittelbar nach dem Workshop (MZP 2) erhöhte sich der Anteil der Personen mit hohem Wissenstand auf 92,9 % (n=13). Ein Jahr nach dem Workshop (MZP 3) erreichten alle 5 Personen (100 %) einen hohen Wissensstand (Abbildung 4).

Abbildung 4 Wissensstand der Teilnehmerinnen zu den Messzeitpunkten 1, 2 und 3 ($n_{MZP\ 1}=15$, $n_{MZP\ 2}=14$, $n_{MZP\ 3}=5$)



Fazit

Bei den Evaluationsteilnehmerinnen hatte zwischen MZP 1 und MZP 2 ein Wissenszuwachs stattgefunden. Vor dem Workshop (MZP 1) erreichten die Teilnehmerinnen im Mittel $20,7 \pm 5,8$ Punkte und unmittelbar nach dem Workshop (MZP 2) im Mittel $26,2 \pm 2,8$ Punkte. Der Wissenserwerb konnte auch ein Jahr nach dem Workshop beibehalten werden. Zum MZP 3 erreichten die Teilnehmerinnen im Mittel $24,6 \pm 1,1$ Punkte.


4.2.3. Anwendbarkeit der vermittelten Inhalte im Lebensalltag

4.2.3.1. Umsetzbarkeit der Ernährungstipps/Informationen allgemein

Ein Jahr nach dem Workshop (MZP 3) wurden die Teilnehmerinnen gefragt, ob die im Workshop vermittelten Ernährungstipps/Informationen für sie im Alltag leicht umsetzbar waren/sind. Alle 10 Befragten beantworteten diese Frage.


Die Zustimmung zur Aussage, dass die im Workshop vermittelten Ernährungstipps/Informationen im Alltag leicht umsetzbar waren/sind, lag ein Jahr nach dem Workshop bei 100 %, wobei 60,0 % (n=6) der Teilnehmerinnen völlig zustimmten und 40,0 % (n=4) „stimme zu“ wählten (Abbildung 5).

Abbildung 5 *Umsetzbarkeit der im Workshop vermittelten Ernährungstipps/Informationen* ($n_{gesamt}=10$)



4.2.3.2. Umsetzung der Inhalte des Workshops im Alltag

Ein Jahr nach dem Workshop wurden die Teilnehmerinnen befragt, inwieweit die folgenden Inhalte des Workshops für sie umsetzbar waren: a) Einführung der ersten festen Nahrung (Beikost), b) Nahrungsmittel, die im 1. Lebensjahr zu meiden sind, c) Einführung von glutenhaltigem Getreide, d) Hygiene bei der Essenzubereitung, e) Zubereitungstipps für Breie. Abbildung 6 gibt einen Überblick über die prozentuelle Verteilung der Antworten auf die einzelnen Fragen zur Umsetzbarkeit der Workshopinhalte. Eine genauere Beschreibung der Antworthäufigkeiten zu den Teilfragen findet sich im Anschluss.

Abbildung 6 Umsetzbarkeit der Workshopinhalte im Alltag ($n_{\text{gesamt}}=10$)

Einführung der ersten festen Nahrung (Beikost)

Die Frage inwieweit der folgende Inhalt des Workshops „Einführung der ersten festen Nahrung (Beikost)“ für die Teilnehmerinnen im Alltag umsetzbar war, beantworteten zum MZP 3 alle 10 befragten Teilnehmerinnen in Niederösterreich.

Ein Jahr nach dem Workshop waren alle Teilnehmerinnen der Ansicht, dass die Workshopinhalte zur „Einführung der ersten festen Nahrung (Beikost)“ im Alltag „sehr gut“ (70,0 %, $n=7$) oder „gut“ (30,0 %, $n=3$) umsetzbar waren (Abbildung 6).

Nahrungsmittel, die im 1. Lebensjahr zu meiden sind

Die Frage inwieweit der Inhalt des Workshops zu „Nahrungsmitteln, die im 1. Lebensjahr zu meiden sind“ für die Teilnehmerinnen im Alltag umsetzbar war, beantworteten zum MZP 3 alle der 10 befragten Teilnehmerinnen in Niederösterreich.

Ein Jahr nach dem Workshop waren alle Teilnehmerinnen der Ansicht, dass die Workshopinhalte zu den im 1. Lebensjahr zu meidenden Lebensmitteln im Alltag „sehr gut“ (70,0 %, $n=7$) oder „gut“ (30,0 %, $n=3$) umsetzbar waren. Keine Person wählte die Antwortmöglichkeiten „mittelmäßig“, „weniger gut“, „schlecht“ oder „weiß nicht“ (Abbildung 6).

Einführung von glutenhaltigem Getreide

Die Frage inwieweit der Inhalt des Workshops zur „Einführung von glutenhaltigem Getreide“ für die Teilnehmerinnen im Alltag umsetzbar war, beantworteten zum MZP 3 alle der 10 befragten Teilnehmerinnen in Niederösterreich.

Ein Jahr nach dem Workshop waren 90,0 % der Teilnehmerinnen der Ansicht, dass die Workshopinhalte zur Einführung von glutenhaltigem Getreide im Alltag „sehr gut“ (80,0 %, n=8) oder „gut“ (10,0 %, n=1) umsetzbar waren. Eine/r der Befragten (10,0 %) beantwortete die Frage nach der Umsetzbarkeit im Alltag der Inhalte des Workshops über die Einführung von glutenhaltigem Getreide mit „mittelmäßig“. Keine Person beurteilte die Umsetzbarkeit mit „weniger gut“ oder „schlecht“ und keine Teilnehmerin wählte „weiß nicht“ (Abbildung 6).

Hygiene bei der Essenszubereitung

Die Frage inwieweit der folgende Inhalt des Workshops „Hygiene bei der Essenszubereitung“ für die Teilnehmerinnen im Alltag umsetzbar war, beantworteten zum MZP 3 alle 10 befragten Teilnehmerinnen in Niederösterreich.

Ein Jahr nach dem Workshop waren alle Teilnehmerinnen der Ansicht, dass die Workshopinhalte zur „Hygiene bei der Essenszubereitung“ im Alltag „sehr gut“ (90,0 %, n=9) oder „gut“ (10,0 %, n=1) umsetzbar waren (Abbildung 6).

Zubereitungstipps für Breie

Die Frage inwieweit die im Workshop erhaltenen „Zubereitungstipps für Breie“ für die Teilnehmerinnen im Alltag umsetzbar waren, beantworteten zum MZP 3 alle der 10 befragten Teilnehmerinnen in Niederösterreich.

Ein Jahr nach dem Workshop waren 80,0 % der Teilnehmerinnen der Ansicht, dass die Zubereitungstipps für Breie im Alltag „sehr gut“ (50,0 %, n=5) oder „gut“ (30,0 %, n=3) umsetzbar waren. Jeweils eine/r der Befragten (10,0 %) beantwortete die Frage nach der Umsetzbarkeit der Zubereitungstipps für Breie im Alltag mit „mittelmäßig“ bzw. „weniger gut“. Für die Antwortmöglichkeit einer schlechten Umsetzbarkeit im Alltag entschied sich keine Teilnehmerin. Ebenso wählte keine der befragten Personen „weiß nicht“ (Abbildung 6).

Fazit

In Niederösterreich lag der Anteil jener, die der Aussage, dass die Ernährungstipps/Informationen leicht im Alltag umsetzbar waren/sind, völlig zustimmten beziehungsweise zustimmten bei 100 %. Am besten umsetzbar empfanden die Befragten die Informationen über Hygiene bei der Essenszubereitung. Am wenigsten gut umsetzbar empfanden die Teilnehmerinnen die Zubereitungstipps für Breie.

4.2.4. Steigerung der Selbstwirksamkeit der (werdenden) Eltern und Bezugspersonen


4.2.4.1. Beitrag des Workshops für die Gesundheit des Kindes

Vor dem Workshop (MZP 1) und unmittelbar nach dem Workshop (MZP 2) wurden die Teilnehmerinnen gefragt, wie sicher sie sich sind, dass die Empfehlungen des Workshops einen großen Beitrag für die Gesundheit ihres Babys leisten können. Ein Jahr nach dem Workshop (MZP 3) wurden die Teilnehmerinnen erneut gefragt, wie sicher sie sich sind, dass die Empfehlungen des Workshops einen großen Beitrag für die Gesundheit ihres Babys leisten konnten.

Die Frage nach der selbst empfundenen Auswirkung der Empfehlungen des Workshops auf die Gesundheit des Babys, beantworteten 14 der 15 in Niederösterreich befragten Workshopteilnehmerinnen (93,3 %) zum MZP 1. Unmittelbar nach dem Workshop gaben alle 15 Personen, die den Fragebogen ausfüllten, eine Antwort. Ein Jahr nach dem Workshop beantworteten ebenfalls alle 10 befragten Workshopteilnehmerinnen die Frage. Die Ergebnisse zu MZP 1 und 2 sind im Evaluationsbericht 2012 beschrieben und in Abbildung 7 dargestellt.

Im Vergleich zu den Einschätzungen zum MZP 2 beantworteten ein Jahr nach dem Workshop nur noch 60,0 % der Teilnehmerinnen (n=6) diese Frage mit „stimme völlig zu“, der prozentuale Anteil war jedoch immer noch fast doppelt so hoch wie bei MZP 1. Der Anteil an Personen, welche bei MZP 3 „stimme zu“ antworteten (10,0 %, n=1), sank insgesamt über die Messzeitpunkte hinweg und halbierte sich verglichen mit MZP 2. Der Prozentsatz an Befragten, die nur teilweise ihre Zustimmung auf diese Frage gaben, stieg hingegen auf 20,0 % (n=2). Keine Person entschied sich ein Jahr nach dem Workshop, wie bereits zu MZP 1 und 2, für die Antwort „stimme eher nicht zu“ und ausschließlich ein/e Teilnehmerin (10,0 %) für „stimme gar nicht zu“ (Abbildung 7). Zu berücksichtigen ist die bei allen 3 Messzeitpunkten geringe Stichprobe.

Abbildung 7 „Selbstwirksamkeit“ – Vergleich MZP 1 ($n_{gesamt}=15$) mit MZP 2 ($n_{gesamt}=15$) und mit MZP 3 ($n_{gesamt}=10$)



Beim Querschnittsvergleich der Messzeitpunkte 1, 2 und 3 zeigte sich kein signifikanter Unterschied in der Einschätzung, inwiefern die Empfehlungen des Workshops einen großen Beitrag für die Gesundheit des Babys leisten ($p>0,05$).


4.2.4.2. Umsetzung der Empfehlungen trotz Hindernissen

Vor dem Workshop (MZP 1) und unmittelbar nach dem Workshop (MZP 2) wurden die Teilnehmerinnen gefragt, wie sicher sie sich sind, es zu schaffen, die Empfehlungen des Beikostworkshops umzusetzen, auch wenn Hindernisse auftreten. Ein Jahr nach dem Workshop (MZP 3) wurden die Teilnehmerinnen gefragt, ob sie es geschafft haben, die Empfehlungen des Workshops trotz Hindernissen umzusetzen.

Die Frage zur Umsetzbarkeit der Empfehlungen beantworteten 14 der 15 Workshopteilnehmerinnen (93,3 %) zum MZP 1. Unmittelbar nach dem Workshop gaben alle 15 Personen, die den Fragebogen ausfüllten, eine Antwort. Ein Jahr nach dem Workshop beantworteten ebenfalls alle der 10 befragten Workshopteilnehmerinnen die Frage. Die Ergebnisse zu MZP 1 und 2 sind im Vorjahresbericht beschrieben und in Abbildung 8 dargestellt.

Im Vergleich zu den Einschätzungen zum MZP 2 beantworteten ein Jahr nach dem Workshop nur noch jeweils 40,0 % der Teilnehmerinnen (je $n=4$) die Frage mit „stimme völlig zu“ oder „stimme zu“. Je ein/e Evaluationsteilnehmerin (je 10,0 %) stimmte nach einem Jahr nur teilweise bzw. eher nicht zu, es geschafft zu haben, die Empfehlungen trotz Hindernissen umzusetzen. Wie bereits bei den Messzeitpunkten 1 und 2 zuvor antwortete keine Person „stimme gar nicht zu“ (Abbildung 8). Zu berücksichtigen ist die bei allen 3 Messzeitpunkten geringe Stichprobe.

Abbildung 8 Umsetzbarkeit der Empfehlungen – Vergleich MZP 1 mit MZP 2 ($n_{gesamt}=15$) und MZP 3 ($n_{gesamt}=10$)



Beim Querschnittsvergleich der Messzeitpunkte 1, 2 und 3 zeigte sich kein signifikanter Unterschied in der Einschätzung der Umsetzbarkeit der Empfehlungen des Beikostworkshops trotz Hindernissen ($p>0,05$).

Fazit

Die Einschätzung, inwiefern sich die Befragten sicher waren, dass die Empfehlungen des Workshops einen großen Beitrag für die Gesundheit des Babys leisten, war zwischen den drei Messzeitpunkten nicht signifikant unterschiedlich.

Auch die Einschätzung der Umsetzbarkeit der Empfehlungen des Beikostworkshops trotz Hindernissen änderte sich zwischen den Messzeitpunkten nicht signifikant.

4.3. Weiterempfehlung und erneute Teilnahme

4.3.1. Weiterempfehlung des Workshops „Babys erstes Löffelchen – Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter“

8 der 10 Evaluationsteilnehmerinnen (80,0 %) antworteten auf die Frage „Haben Sie den Workshop weiterempfohlen“ mit „Ja“, während eine Person (10,0 %) die Frage verneinte und eine Person (10,0 %) diesbezüglich keine Angabe machte.

4.3.2. Teilnahme an einem Workshop zum Thema „Ernährung von Ein- bis Dreijährigen“

Auf die Frage „Würden Sie einen Workshop zum Thema „Ernährung von Ein- bis Dreijährigen“ besuchen?“ machten alle 10 befragten Teilnehmerinnen (100 %) zum MZP 3 eine Angabe. 90,0 % der Befragten (n=9) antworteten mit „Ja“ und lediglich 10,0 % bzw. eine Person mit „Nein“.

5 Anhang

An dieser Stelle werden die Antworten der offenen Fragen der Evaluationsteilnehmerinnen aufgelistet. Wie oft die einzelnen Antworten gegeben wurden, steht jeweils rechts neben der Antwort in Klammer.

Haben Sie noch weitere Anmerkungen?

- Infos und Rezepte für Nahrungsmittel wie Amaranth, Bulgur, Buchweizen, Quinoa wären toll. (1)
- Meiner Tochter habe ich schon mit 8-9 Monaten rohes Obst gegeben, deshalb teile ich nicht die Meinung rohes Obst und Gemüse im ersten Jahr zu verbieten. (1)